

Prévient les carences en bore. Facilite la germination du pollen et la synthèse des sucres et des protéines

Caractéristiques et actions sur les cultures

BOROGREEN L (Bore Ethanolamine) rééquilibre la plante en bore tout en facilitant sa rapide migration vers les organes végétaux. La formulation favorise la migration des sucres dans la sève, l'activité des méristèmes apicaux, la pollinisation et agit à titre préventif et curatif contre la déficience en Bore qui cause une baisse de la mise à fruits, leur chute physiologique, une moindre résistance au gel et aux maladies cryptogamiques.

BOROGREEN L est spécialement recommandé quand la sécheresse limite la disponibilité en bore dans le sol en contrecarrant la déformation des fruits, la nécrose des jeunes feuilles, le millerandage de la vigne et en assurant une fécondation homogène des fleurs et l'élasticité des parois cellulaires. Il apporte aussi des avantages énormes à toutes les plantes sensibles à la carence en bore telles que la betterave, la pomme de terre et le maïs.



APPLICATION FOLIAIRE

الرش الورقي



FERTIRRIGATION

الري المخصب

يقي ويصح نقص البور، يسهل إنتاش غبار الطلع وتركيب السكريات والبروتينات

الخصائص والآثار على المحاصيل

بوروجرين ل (بور إيثانول أمين) يعيد توازن البور في النبتة بتسهيل تغلغله السريع نحو الأنسجة النباتية. التركيبة تعزز تغلغل السكريات في النسغ. فعالية المريستام الفوق (apicaux méristèmes)، التلقيح ويتدخل بشكل وقائي وعلاجي ضد نقص البور الذي يسبب ضعف تكون الثمار. السقوط الفيزيولوجي، بصفة ثانوية مقاومة الصقيع ومقاومة الأمراض الفطرية.

بوروجرين ل يوصى به خصوصا عندما يَحْدُ الجفاف من وفرة البور في التربة. بالتصدي لتشوه الثمار ونخر الأوراق الفتية وإجهاض عقد العنب، وبضمان إخصاب متناسق للأزهار ومرونة جدران الخلايا. كما يضيفي مزايا معتبرة على جميع النباتات ذات الحساسية لنقص البور. كالشمندر، البطاطا والذرة.

طرق وجرع الإستعمال

Cultures المحاصيل	Doses الجرع		PÉRIODE D'APPLICATION ET RECOMMANDATIONS فترة التطبيق والتوصيات
	Foliaire الرش الورقي	Fertirrigation الري المخضب	
Arboriculture fruitière زراعة الأشجار المثمرة	150 à 200 ml/hl 200 - 150 ملل/هـل	2 à 5 L / ha 50 - 25 ل / هـك	Pré-floraison et à la nouaison sur pommier, poirier, actinidia, vigne et olivier. Un traitement ultérieur foliaire 14 jours avant la récolte
Fruits à noyaux الثمار ذوات النواة	150 à 200 ml/hl 200 - 150 ملل/هـل	2 à 5 L / ha 50 - 25 ل / هـك	قبل الإزهار وعند عقد الثمار على أشجار التفاح، الإجاص، فصيلة الكيوي، العنب والزيتون. معالجة لاحقة (متأخرة) وَرَقِيَّة 14 يومًا قبل الجني.
Olivier أشجار الزيتون	150 à 200 ml/hl 200 - 150 ملل/هـل	à 5 L / ha 2 50 - 25 ل / هـك	Pré et post-floraison. قبل وبعد الإزهار.
Viticulture الكرم	150 à 200 ml/hl 200 - 150 ملل/هـل	2 à 5 L / ha 50 - 25 ل / هـك	Pré et post-floraison pour favoriser la nouaison, contre le millerandage. قبل وبعد الإزهار لتعزيز عقد الثمار، ضد آفة إجهاض حبات العنب.
Maraîchage et légumineuses الخضروات والبقول	100 à 150 ml/hl 150 - 100 ملل/هـل	2 à 4 L / ha 4 - 2 ل / هـك	Traitement sur la végétation développée et en pré-floraison معالجة النباتات النامية والتي هي في مرحلة ما قبل الإزهار.
Cultures industrielles المحاصيل الصناعية	150 à 200 ml/hl 200 - 150 ملل/هـل	2 à 3 L / ha 3 - 2 ل / هـك	Traitement foliaire au stade de pré-floraison et cas de carence معالجة وَرَقِيَّة في مرحلة ما قبل الإزهار وفي حالة النقص (الفقر).
Floriculture الأزهار ونباتات الزينة	80 à 100 ml/hl 100 - 80 ملل/هـل	0,1 à 0,2 L / 1000m ² 0,2 - 0,1 ل / 1000م ²	Traitement foliaire ou racinaire en pré-floraison et en cas de carence معالجة وَرَقِيَّة أو جذرية في مرحلة ما قبل الإزهار وفي حالة النقص (الفقر).

Composition : % p/p التركيب (% وزن / وزن)

Bore (B) soluble dans l'eau	11% p/p (15% p/v)	بور (B) ذائب في الماء
-----------------------------	-------------------	-----------------------

Propriétés physico-chimiques الخصائص الفيزيو-كيميائية

Densité 20°C :	1,36 g/ml approx	الكثافة (في 20 م°) :
pH (sol. aq. 1%):	8,0±0,5 u. pH	درجة الحموضة (PH) (1P % صلب، مائي، وزن/وزن)
Conductivité électrique (sol. aq. 1 g/l):	220 µS/cm	النقلية الكهربائية : (صلب، مائي، 1 غرام/ل)

Conditionnement التعبئة

J1L



J5L

Produit **Green Has Italia**

Aux racines de la production

Adresse : Lotissement A, Villa n° 34 Ain Benian-Alger

Tél. : 023 21 02 87 Fax : 023 21 02 88

www.srid-dz.com